

TIPO: BIOESTIMULANTE A BASE DE EXTRACTO DE ALGAS ENRIQUECIDO CON CALCIO.

Composición:

Calcio (CaO)	20,0% p/v.
Extracto de algas marinas (<i>Macrocystis pyrifera</i>).	20,0 % p/v.
Densidad :	1,172 g/L
pH :	7,5-8,5
Solubilidad :	100 %

VECA PLUS CALCIO Es un Bioestimulante de una alta concentración en Calcio (Ca), que previene y corrige las posibles deficiencias de Calcio (Ca) en todos los tipos de cultivos. Su especial formulación con extracto de algas aseguran la plena asimilación de este elemento, consiguiendo de esta manera un excelente desarrollo de cualquier órgano en crecimiento. **VECA PLUS CALCIO** contiene *Macrocystis pyrifera*, alga que gracias a sus componentes activos que logran potenciarse y formar un efecto sinérgico en la planta, van a estimular a nivel celular diversos procesos fisiológicos, que nos permitirán alcanzar una mayor asimilación, absorción y transporte de nutrientes.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

Fuente de CaO inmediata.

Frutos más grandes.

Mayor firmeza.

Mejora vida de post cosecha de frutas y hortalizas.

Corrige deficiencias como el "Bitter Pit" en manzanas, necrosis foliar en lechuga, "blossom end rot" en pepino, podredumbre apical en tomates, corazón hueco de la frutilla (fresa).

Forma parte estructural de la membrana y pared celular (Pectatos de Calcio), ayudando a una mejor resistencia.

Ayuda a conferir flexibilidad y adaptación a fenómenos de estrés biótico, debido a su inducción de síntesis de sustancias de respuestas.

FITOTOXICIDAD:

No presenta ningún tipo de fitotoxicidad al aplicarlo siguiendo las indicaciones de la etiqueta.

ALMACENAMIENTO:

Debe ser conservado bajo un ambiente fresco y seco.

Evitar temperaturas extremas.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios.

No mezclar con productos de extrema reacción ácida o alcalina, se recomienda hacer una pequeña prueba de compatibilidad antes de mezclar con otros productos.

No mezclar con fosfatos, sulfatos y boratos.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

No aplicar con temperaturas extremas.

INDICACIONES DE APLICACIÓN

CULTIVO	DOSIS L/ha	MOMENTO DE APLICACIÓN Y OBSERVACIONES
Uva De Mesa Vinífera y Pisquera	4-6	Primera aplicación en pre-flor para fortalecer la estructura del raquis. Segunda aplicación en bayas de 4-5 mm. Tercera aplicación repetir cada 5-7 días. En uvas sin semillas mezclar con los Giberélicos de crecimiento.
Manzanos, Peral, Membrillo	4-6	Realizar un mínimo de 4-7 aplicaciones. Primera aplicación en flor. Segunda aplicación en fruto cuajado, repetir 3 vueltas cada 7 días. Sexta aplicación 21 días antes de cosecha. Séptima aplicación 15 días antes de cosecha.
Limonos, Naranjos, Mandarinos, Pomelos, Tangelos, Clementinas, Paltos y Olivos	4-6	Primera aplicación en flor. Segunda aplicación en fruto cuajado y repetir 3 vueltas cada 7 días.
Cerezo, Ciruelo, Durazno, Damasco, Nectarin, Avellano, Almendros, Pecano, Nogal, Kiwi, Granados, Higuera, Caqui, Banano, Café, Chirimoyo, Papayo	4-6	Primera aplicación en flor. Segunda aplicación en fruto cuajado y repetir 3 vueltas cada 7 días.
Piña, Cacao	4-6	Primera aplicación en flor. Segunda aplicación en fruto cuajado y repetir 3 vueltas cada 7 días.
Arándanos, Frambuesas, Moras, Grosellas, Frutillas (Fresas), Zarzaparrilla, Murta.	4-6	Primera aplicación en brotación. Segunda aplicación floración. Tercera aplicación fruto cuajado. Cuarta aplicación fruto en crecimiento *Se recomienda aplicar junto a VecaBalance 2L/ha.
Lechuga, Apio, Endivia, Acelga, Achicoria, Espinacas, Brásicas, Alcachofas, Radicchio, Papa, Zanahoria, Tabaco	4-6	Primera aplicación en crecimiento vegetativo activo, repitiendo cada 7 días. Para apio y alcachofa aplicar cada 15 días desde el cubrimiento del 25% de cultivo, para corazón negro.
Leguminosas, Algodón	4-6	Aplicar a los 15-20 días de emergencia de la planta. Segunda aplicación en botón floral. Tercera aplicación en formación y/o crecimiento de las vainas, En algodón tercera aplicación en formación de cápsula.
Cereales Y Granos.	4-6	Primera aplicación en crecimiento vegetativo. Segunda aplicación en macolla. Tercera aplicación grano lechoso.

CULTIVO	DOSIS L/ha	MOMENTO DE APLICACIÓN Y OBSERVACIONES
Cucurbitáceas; Pepinos, Melones, Sandías, Zapallo Y Zapallo Italiano, Tomate, Pimentón, Ají, Paprika, Berenjena	4-6	Aplicar de fruto recién cuajado cada 15 días para evitar necrosis apical hasta antes de cosecha.
Papas	4-6	Primera aplicación inicios de crecimiento vegetativo. Repetir cada 10 días hasta completar de 3-4 aplicaciones.
Aliáceas, Flores Bulbosas, Remolacha Azucarera	4-6	Primera aplicación inicio de bulbificación. Repetir a los 30 y 15 días antes de cosecha.
Praderas	4-6	Aplicar al inicio del crecimiento vegetativo en primavera.
Flores De Corte.	4-6	Aplicar a inicio de aparición de botones/cápsula.

MÁS INFORMACIÓN

Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro representante de su zona o enviar un correo con sus dudas y/o consultas a

contacto@agroveca.cl

Fabricado, distribuido y/o importado en Chile por Agroveca SpA.
Germán Riesco 302 - Providencia-Santiago.
contacto@agroveca.cl

