



N°	Estado Fenológico	Tratamiento / Objetivo	Producto Comercial	Ingrediente Activo	Dosis (lts/ha)
1	Brotación	Inducción sist.	Vecasil Forte	Silicio	20
		Defensa	+	+	+
		Enraizante	Veca Root Max	Auxinas	20
		+	+	+	+
		Nutrición Foliar	Veca nutri mix	<i>Macrocystis pyrifera</i>	4
2	Brote 5-10 cm		Veca Balance	<i>Macrocystis pyrifera</i>	3
			+	+	+
		Nutrición Foliar	Veca Plus Zinc	Zinc (Zn)	3
		+	+	+	+
		Veca Plus Magnesio	Magnesio (Mg)	3	
3	Floración		Veca Balance	<i>Macrocystis pyrifera</i>	3
			+	+	+
			Veca Amin	Aminoácidos y Algas	3
			+	+	+
		Nutrición Foliar	Veca Plus Boro	Boro (B)	2
		+	+	+	+
		Veca Plus Zinc	Zinc (Zn)	3	
		+	+	+	
		Veca Plus Calcio	Calcio (CaO)	4	
4	Fruto cuajado		Veca Balance	<i>Macrocystis pyrifera</i>	3
			+	+	+
			Veca Amin	Aminoácidos y Algas	3
			+	+	+
		Nutrición Foliar	Veca Plus Boro	Boro (B)	2
		+	+	+	+
		Veca Plus Calcio	Calcio (CaO)	4	
		+	+	+	
		Veca Plus Magnesio	Magnesio (Mg)	3	
5	Crecimiento de fruto		Veca Amin	Aminoácidos y Algas	3
			+	+	+
		Nutrición Foliar	Veca Plus Calcio	Calcio (CaO)	4
		+	+	+	+
		Veca Plus Potasio	Potasio (K)	5	
6	Precosecha		Veca Amin	Aminoácidos y Algas	3
			+	+	+
		Nutrición Foliar	Veca Plus Potasio	Potasio (K)	5

\* Aplicación de enraizantes VECA ROOT MAX y de Silicio VECASIL FORTE dependerá del tipo de riego. Se recomienda aplicar durante todo el desarrollo fenológico o según necesidad.

\*\* Realizar 2 aplicaciones de VECA HUMIC ROOT en los flush radicular.

\*\*\*En caso de daño por heladas realizar 1 o 2 aplicaciones de VECA AMIN SUGAR 4 L/HA + VECA CALCIO-BORO 4 L/HA