

TIPO: Especialidad/Bioestimulante natural traslocador de reservas.

Composición:

| | |
|---|------------|
| Boro. (B). | 8,0% p/v. |
| Molibdeno. (Mo). | 0,1% p/v. |
| Extracto de algas (<i>Macrocystis pyrifera</i>) : *Manitol y L-Prolina | 20,0% p/v. |

| | |
|----------------|--------------|
| Densidad : | 1,2-1,5 g/cc |
| pH : | 8-9 |
| Solubilidad. : | 100% |

Veca Move: Bioestimulante líquido diseñado con una formulación especial que promueve una mayor tolerancia y eficiencia en los procesos fisiológicos demandantes de energía, como son el movimiento o traslocación de fotoasimilados a los órganos de reserva, aumento de sólidos solubles, color y lignificación.

Contiene compuestos antioxidantes naturales que aumentan la funcionalidad y redistribución de los carbohidratos, manteniendo un flujo mucho más eficiente y prolongado a los órganos de reserva (raíz, yemas, frutos, etc.).

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Aumenta coloración y sólidos solubles en vegetales y/o frutos.
- Promueve la lignificación de madera ayudando a la entrada en receso.
- Aumento de la metabolización del Nitrógeno inorgánico a Nitrógeno orgánico.
- Promueve la activación de la planta frente a condiciones de estrés.

FITOTOXICIDAD:

No presenta ningún tipo de fitotoxicidad al aplicarlo siguiendo las indicaciones de la etiqueta.

ALMACENAMIENTO: Debe ser conservado bajo un ambiente fresco y seco.
Evitar temperaturas extremas.

COMPATIBILIDAD:

No mezclar con productos de extrema reacción ácida o alcalina, se recomienda hacer una pequeña prueba de compatibilidad antes de mezclar con otros productos.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

No aplicar con temperaturas extremas.

INDICACIONES DE APLICACIÓN FOLIAR

| CULTIVO | DOSIS L/ha | MOMENTO DE APLICACIÓN Y OBSERVACIONES |
|---|------------|--|
| Uva De Mesa, Vinífera y Pisquera | 5-6 | Aplicar en ablande generalizado y repetir a los 15 días. |
| Limones, Naranjos, Palto, Mandarinos, Pomelos, Tangelos, Clementinas, Chirimoyo, Papayo. | 5-6 | *Aplicar en quiebre de color, repetir a los 10-15 días. |
| Durazno, Damasco, Ciruelo, Cerezo, Nogal, Almendro, Avellano, Pecano, Granado, Higuera, Caqui, Banano, Café, Cacao, Nectarín, manzano Peral, Membrillo, Kiwi, Cucurbitáceas, Pepino dulce | 5-6 | *Aplicar 30 días antes de cosecha y repetir 15 días después En caducos se puede realizar otra aplicación a inicios de caída de hojas para favorecer la movilización de azúcares de reserva. |
| Frambuesas, Moras, Grosellas Zarzaparrilla, Murta, Arándanos, Frutillas (fresas). | 4-5 | Aplicar en quiebre de color y repetir a los 10-15 días. |
| Pimiento, Paprika, Berenjena, Ají. | 4-5 | Aplicar de 15-20 días antes de cosecha. |

| CULTIVO | DOSIS L/ha | MOMENTO DE APLICACIÓN Y OBSERVACIONES |
|--|------------|---|
| Tomate | 4-5 | Aplicar en quiebre de color y repetir 10 días después. |
| Papas | 4-5 | Aplicar a inicio de llenado de tubérculo y 30 días antes de cosecha. |
| Brásicas | 4-5 | Primera aplicación a inicios de formación del pan, repetir 7 días posterior. |
| Ajos, Cebollas, Zanahorias | 4-5 | Aplicar en inicio de llenado de bulbo y/o 30 días antes de cosecha. |
| Maíz | 4-5 | Aplicación 15 días antes de floración. |
| Arroz, Trigo, Avena, Cebada. | 4-5 | Aplicar a Inicio de crecimiento de macolla. |
| Algodón. | 4-5 | Aplicación pre-flor y aplicar cada 7 días hasta completar el periodo de cuajado en el 1/3 superior. |
| Flores, Flores bulbosas, Plantas ornamentales, Tabaco. | 3-4 | Aplicar en pre-flor y hasta 14 días antes de cosecha. |
| Viveros, Plantaciones nuevas | 3-4 | Para lignificación y acumulación de reservas aplicar cuando las temperaturas comiencen a disminuir. |
| Praderas | 3-4 | Aplicar a inicios de crecimiento de macolla y después de cada corte. |
| Leguminosas (Arveja, Lenteja, Habas, Garbanzos, Porotos, Soya, Lupino) | 3-4 | Aplicar en aparición de vainas y entre 15-20 días antes de cosecha. |
| Espárrago | 4-5 | Aplicar a los 30 y 15 días antes de senescencia vegetativa o maduración. |
| Caña de azúcar | 4-5 | Aplicación a la aparición del 1/4 tallo de caña emerja de la corona. |

Nota: Se recomienda aplicación en conjunto a VECA PLUS POTASIO para un mejor resultado.

MÁS INFORMACIÓN

Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro representante de su zona o enviar un correo con sus dudas y/o consultas a

contacto@agroveca.cl

Fabricado , distribuido y/o importado por Veca Tecnología Agrícola SpA.
Padre Mariano 391 Of - 704 - Providencia Santiago.
contacto@agroveca.cl