

TIPO: BIOESTIMULANTE A BASE EXTRACTO DE ALGAS, ENRIQUECIDO CON BORO

Composición:

Extracto de algas marinas (<i>Macrocystis pyrifera</i>):	15,0% p/v
Boro. (B).	10,0 % p/v.
Densidad. :	0,998 g/L
pH :	6,0-6,5
Solubilidad. :	100 %

VECA®PLUS BORO es un bioestimulante a base de Boro enriquecido con extracto de algas, maximizando la absorción y translocación de este compuesto..

VECA®PLUS BORO contiene *Macrocystis pyrifera*, alga que gracias a sus componentes activos que logran potenciarse y formar un efecto sinérgico en la planta, van a estimular a nivel celular diversos procesos fisiológicos, que nos permitirán alcanzar una mayor asimilación, absorción y transporte de nutrientes.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

Ayuda en la síntesis de proteínas y ácidos nucleicos, participa en la distribución y absorción de azúcares, ya que forma complejos de Polioliol-Boro-Polioliol (alcohol-azúcar) en especies de la familia Rosáceas, favoreciendo la entrada de fotoasimilados hacia el fruto.

Ayuda a la división y elongación celular ya que inhibe la AIA-oxidasa, enzima clave en la regulación de Auxina.

Mejora la resistencia de la planta ante heladas, ya que regula la entrada de agua a las células.

Favorece el transporte de azúcares ayudando a la maduración y germinación del grano de polen y posterior formación del tubo polínico

Mejora la lignificación antes y después de caída de hojas, facilitando la entrada en dormancia en plantas leñosas o caducas.

Ayuda a conferir flexibilidad y adaptación a fenómenos de estrés biótico, debido a su inducción de síntesis de sustancias de respuestas.

FITOTOXICIDAD:

No presenta ningún tipo de fitotoxicidad al aplicarlo siguiendo las indicaciones de la etiqueta.

ALMACENAMIENTO:

Debe ser conservado bajo un ambiente fresco y seco.
Evitar temperaturas extremas.

COMPATIBILIDAD:

No mezclar con productos de extrema reacción ácida o alcalina, se recomienda hacer una pequeña prueba de compatibilidad antes de mezclar con otros productos.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

No aplicar con temperaturas extremas.

INDICACIONES DE APLICACIÓN

CULTIVO	DOSIS L/ha	MOMENTO DE APLICACIÓN Y OBSERVACIONES
Uva De Mesa Vinífera y Pisquera	2-3	Primera aplicación en pre-flor. Segunda aplicación en flor. Tercera aplicación cuaja y/o post-cuaja. Cuarta aplicación en post-cosecha según requerimiento.
Manzanos, Peral, Membrillo, Cerezos Ciruelo, Durazno, Damasco, Nectarín, Avellano, Almendros, Nogal, Pecano, Granados, Olivos, Paltos, Kiwi.	2-3	Primera aplicación en ramillete expuesto/preflor/flor pistilada. Segunda aplicación en flor. Tercera aplicación cuaja y/o post-cuaja. Cuarta aplicación en post-cosecha según requerimiento.
Limonos, Naranjos, Mandarinos, Pomelos, Tangelos, Clementinas	2-3	Realizar dos aplicaciones: En botón floral y plena flor.
Chirimoyo	2-3	1 a 2 aplicaciones a inicios de floración.
Plátano (Banano), Mango, Café, Cacao.	2-3	Realizar de 2-3 aplicaciones antes de floración. (Inicio de floración y el término de esta).
Frutillas (fresas)	2-3	Realizar primera aplicación en botón floral Segunda aplicación en plena flor.
Arándanos, Frambuesas, Moras, Grosellas, Zarparrilla, Murta.	2-3	Primera aplicación en botón floral. Segunda aplicación plena flor. Tercera aplicación en post cosecha según requerimiento.
Granado, Higuera, Caqui, Papayo	2-3	Primera aplicación en botón floral. Segunda aplicación plena flor.
Leguminosas	2	Primera aplicación en botón floral. Segunda aplicación en flor. Tercera aplicación a inicios de crecimiento de las vainas.
Praderas, Caña De Azúcar.	3	Aplicar al inicio de crecimiento vegetativo y después de cada corte.
Algodón	2	Realizar 2-3 aplicación antes durante y al termino de floración.

CULTIVO	DOSIS L/ha	MOMENTO DE APLICACIÓN Y OBSERVACIONES
Papayo, Piña.	2-3	Realizar 2-3 aplicación antes, durante y al término de floración.
Remolacha Azucarera	2	1ª aplicación desde 6 a 8 hojas, segunda aplicación 14-21 días después.
Flores de corte.	2	Aplicar a inicios de brotación y/o botón floral.
Apio	2	40 días después de germinado.
Brásicas	2-3	Antes del inicio de formación del pan, cada 7 días.
Lechuga, Endivia, Acelga, Achicoria, Espinacas, Alcachofas, Zanahoria, Pepinos, Pepinillos, Achicoria, Repollo, Cucurbitáceas.	2-3	Primera aplicación después de siembra/trasplante con suficiente área foliar. Segunda aplicación en floración según necesidad del cultivo.
Cereales, Maíz, Maravilla.	2-3	Primera aplicación a los 30 días post emergencia. Segunda aplicación 45 días post emergencia.
Pimentón, Ají, Paprika, Berenjena, Tomate.	2-3	Primera aplicación en inicio de floración. Segunda aplicación con fruto recién cuajado.
Papas, Papa Camote	2-3	Aplicar a los 20-35-50 días post-emergencia.
Aliáceas, Flores Bulbosas	2	Aplicar a los 20-35-50 días post-emergencia.
Raps	2-3	Primera aplicación en estado de roseta. Segunda aplicación floración.
Espárragos	2-3	Aplicar a la apertura de meristema apical.
Plantas Ornamentales	2-3	Aplicar antes de prefloración.

MÁS INFORMACIÓN

Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro representante de su zona o enviar un correo con sus dudas y/o consultas a

contacto@agroveca.cl

Fabricado , distribuido y/o importado por Veca Tecnología Agrícola SpA.
Padre Mariano 391 Of - 704 - Providencia Santiago.
contacto@agroveca.cl